



手で簡単に
割ることができます。



半錠を服薬する場合は、
服薬直前に割ってお飲みください。

この期間はグルコバイ錠を以下のように正しく服薬しましょう。

月 日 ~ 月 日

朝食直前



錠

昼食直前



錠

夕食直前



錠

グルコバイ錠を服薬する時の注意

グルコバイ錠は、患者さまによって服薬の回数と量が異なります。主治医の先生の指示に従って、服薬しましょう。




バイエル薬品株式会社

資料記号 **GLU・08・1017**

(2008年6月作成) GLU-00.0(DS/FS)

グルコバイの 服薬指導をされる方へ

服薬指導される際は、下記のように「服薬期間」
「1回服薬量」等をご記入いただき、患者さまへ
お渡しください。

①	4月 1日 ~ 4月 30日		
	朝食直前	昼食直前	夕食直前
②			
③	半錠	錠	半錠

① 服薬期間を記入する。

② 1回の服薬量を塗りつぶす。

50mg…錠剤の半分を塗りつぶす。

100mg…錠剤1錠分を塗りつぶす。

③ 1回の服薬量を記入する。

この指導せんは、PTPシートをセットすることができます。
残った半錠はPTPシートに戻し、指導せんにはセットして
保管いただきますようご指導ください。